新冠病毒-19: 莫德納和輝瑞的最新進展



洛杉矶县约有12%的人已经进行了疫苗接种。 洛杉矶县已注射了500万剂，其中包括120万剂為第二剂。

在美国已施用了约1.451亿剂。

莫德納和輝瑞的常见副作用

注射部位出现头痛，疲劳，头晕和疼痛

对于莫德納和輝瑞而言，副作用是相同的，它们通常在接种疫苗后一到两天出现，并在几天后消失。 据报道，年輕人和第二剂后容易出現更多的副作用。

疫苗功效

两劑疫苗過后，莫德納和輝瑞均显示出能有效地预防症状性新冠病毒-19感染的功效

莫德納已显示出94.1%的功效
辉瑞已显示出95%的功效

我应该了解有关疫苗的其他一些重要信息是什么?

莫德納和輝瑞均能有效抵抗在英国和南非发现的SARS-CoV-2变种。

莫德納在对抗英国变种方面比南非变种更有效，并且莫德納目前正在测试一种可以用作南非变种增强剂的新疫苗。

APA Health Care

APA Health Care
Publicity and Activities Committee
Updated on 3/31/2021

新冠病毒-19:

新公司的疫苗

纽约时报疫苗追踪器

单击**此处**以跟踪疫苗和冠状病毒疫苗相关更新的进度。

為什麼要打兩劑?

- 多次劑量可以引發更強的免疫反應並產生更大的免疫力
- 有效免疫需要兩種劑量的疫苗
- 設計成多步驟過程的單劑疫苗功效的數據不足
- 在所有的臨床試驗中均使用了完整的兩劑

如果我以前曾感染過新冠病毒-19，是否仍接種疫苗?

是的！ 美國疾病预防与控制中心(CDC)建議無論您是否患有新冠病毒-19，都應該繼續接種疫苗。即使您之前曾有過新冠病毒-19，專家也不確定您有多長時間可以避免再次感染。

能預防嚴重疾病的疫苗意味著什麼?

所有當前可用的疫苗在預防住院和死亡方面已顯示出100%的有效性。這很重要，因為20%的感染會導致嚴重疾病，而近1%的感染者會死亡。

疫苗如何比较?

公司	種類	劑量	儲存	功效*	分配
莫德納	RNA	2	-25 至 -15°C 7 個月	94.1%	已發行
輝瑞	RNA	2	-80 至 -60°C 6 個月	95%	已發行
諾瓦克斯	基於蛋白質	2	2 至 8°C	95.6%	2021春末
詹森 強生	病毒載體	1	2 至 8°C 3 個月	72%	已發行
阿斯利康	病毒載體	2	2 至 8°C 6 個月	82%	未知

*對原始菌株的功效

APA Health Care
Publicity and Activities Committee
Updated on 3/31/2021

APA Health Care